

โรคพิษสุนัขบ้า




โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อ



ร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ เรบีส ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้



เชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้

ผิวหนังที่ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์ (แต่ถ้าผิวหนังเป็นปกติ เชื้อจะเข้าไปไม่ได้) หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่าง ๆ ได้แก่ เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุช่องปาก

มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้า



ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อเข้าร่างกายจนกระทั่งเกิดอาการบางรายอาจนานเกิน 1 ปี บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แต่โดยเฉลี่ย 3 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ **1.จำนวนเชื้อที่เข้าไป** (บาดแผลใหญ่ ลึกหรือมีหลายแผล มีโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปได้มาก)

2.ตำแหน่งที่เชื้อเข้าไป (ถ้าอยู่ใกล้สมองมาก เชื้อก็จะเดินทางไปถึงสมองได้เร็วหรืออยู่ในที่มีปลายประสาทมาก เช่น มือหรือเท้า เชื้อก็จะเข้าสู่ระบบประสาทได้ง่าย)

3.อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความต้านทานของโรคต่ำกว่าคนหนุ่มสาว)

4.สายพันธุ์ของเชื้อ ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมียาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์จากสุนัข

อาการที่พบในสัตว์

โรคพิษ
สุนัขบ้า



ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะพักตัวไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2 – 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัวออกไปหลบซุกตัวเงียบๆ มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยขลาดกลัวคนก็จะกลับมามากล่อเคลีย เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าวกินน้ำน้อยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ

ระยะตื่นเต้น คือ เริ่มมีอาการทางประสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ถ้ากัดขังหรือล่ามไว้ จะกัดกรงหรือโซ่จนเลือดคอปากโดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง

ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอกหรือขยอนคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม

อาการที่พบในคน

อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการของสมองอักเสบ และไขสัน



หลังอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ แล้วลามไปส่วนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเป็นแผลอักเสบ มีน้ำเหลือง ต่อมาจะกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลงบ่อยๆ บางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคทางจิต มีอาการกลืนลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ มีอาการกลัวน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคกลัวน้ำ ไม่อยากกลืนแม้กระทั่งน้ำลาย จึงทำให้น้ำลายไหล บางคนอาจปวดท้องน้อยและขา คนไข้เพศชายบางรายมีน้ำอสุจิไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว กล้ามเนื้อกระตุก แขนหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาตหมดสติและตายในที่สุด

“โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีน”



โรคพิษสุนัขบ้าสามารถ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ตายแล้ว และไม่ก่อเกิดโรค วัคซีนนี้สามารถให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเมื่อถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคนี้กัด วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค หากฉีดได้ครบตามกำหนด

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจะต้องให้กี่ครั้ง อย่างไร



การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่ 2 แบบ คือ

1. การให้เพื่อป้องกันก่อนได้รับเชื้อ (ก่อนถูกสัตว์กัด) ควรพิจารณาให้แก่ สัตว์แพทย์ สัตวบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในพื้นที่เป็นแหล่งของโรคนี้ ควรจะได้รับวัคซีนชนิดนี้เช่นกัน โดยจะต้องฉีด 3 เข็ม ที่วันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 **2. การให้วัคซีนหลังจากได้รับเชื้อ (หลังจากถูกสัตว์กัด)** บุคคลใดก็ตามที่ถูกกัดโดยสัตว์หรืออาจสัมผัสกับไวรัสพิษสุนัขบ้า ควรรับล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ และควรพบแพทย์โดยทันทีเพื่อทำแผลและให้วัคซีน หากผู้นั้นยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ควรจะได้รับวัคซีนจำนวน 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุด และเข็มต่อมาในวันที่ 3, 7, 14 และ 28 หลังเข็มแรก นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาให้วัคซีนอิมมูโนโกลบูลิ

เพื่อช่วยเสริมสร้างการป้องกันโรคด้วย หากผู้นั้นเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วนานกว่า 6 เดือน ควรจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 2 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุด และอีกเข็มในวันที่ 3 หลังจากเข็มแรก หากเคยได้มาไม่เกิน 6 เดือน ให้ฉีดเพิ่มเพียงเข็มเดียว



เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้

1. ล้างแผล ให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงกับแผลล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง **ใส่ยารักษาแผลสด** **2. จดแจ้งสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักหมา** ไว้ดูอาการ 10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค **3. ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข** เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข



1. นำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อสุนัขอายุ 2-4 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งตามกำหนดนัดและฉีดซ้ำทุกปี

2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพาดในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง **3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย** และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป **“หยุดปล่อยหมา หยุดปัญหาหมาจรจัด”**



โรค

พิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ



 **พิษสุนัขบ้า!**
อย่าชะล่าใจ...ภัยใกล้ตัว

ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์



งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโป ไทร
073-513164 ต่อ 13



